

臨床検査基準値

【血算】		
白血球数	μl	4000~9000
赤血球数	μl	♂410~530 × 10 ⁴ ♀380~480 × 10 ⁴
血色素量	g/dl	♂14~18 ♀12~16
ヘマトクリット値	%	♂40~48 ♀34~42
血小板数	μl	14~40 × 10 ⁴
MCV	fl	78~110
MCH	pl	27~31
MCHC	%	31~36
網状赤血球数	μl	0.8~2.0 × 10 ⁴

【白血球分画】		
Stab	%	医師の判断
Seg.	%	医師の判断
Lympho.	%	医師の判断
Mono.	%	医師の判断
Eosino.	%	医師の判断
Baso.	%	医師の判断

【凝固】		
PT (活性値)	%	70 以上
APTT	秒	27~37
FIB	mg/dl	160~350
TT	%	70 以上
HPT	%	70~140

【生化学】		
TP	g/dl	6.3~8.1
Alb	g/dl	3.7~4.9
ChE	IU/l	♂203~460 ♀179~354
LDH	IU/l	125~237
GOT (AST)	IU/l	9~38
GPT (ALT)	IU/l	4~36
γ-GTP	IU/l	4~68
ALP	IU/l	60~201
TB	mg/dl	0.3~1.3
DB	mg/dl	0~0.2
TC	mg/dl	129~232
HDL	mg/dl	♂30~86 ♀40~99
TG	mg/dl	29~188
Ca	mg/dl	8.4~9.7
IP	mg/dl	2.5~4.5
BUN	mg/dl	9~21
Cr	mg/dl	♂0.60~1.20 ♀0.40~0.90
Na	mEq/l	132~148
K	mEq/l	3.5~4.9
Cl	mEq/l	96~108
UA	mg/dl	♂3.0~7.2 ♀2.1~6.0
Amy	IU/l	♂39~156 ♀57~174
CK	IU/l	♂55~210 ♀44~166

【生化学】		
Fe	μg/dl	♂64~187 ♀40~162
UIBC	μg/dl	126~358
CRP	mg/dl	0.3 以下
AcP	U/l	7.1~12.6
Pr. AcP	U/l	2.1 以下
リパーゼ	IU/l	12~51
Mg	mg/dl	1.6~2.4
胆汁酸	μmol/l	食前 0~11 食後 0~20
ASO	IU/ml	241 以下
RA	IU/ml	20 以下
IgA	mg/dl	110~410
IgG	mg/dl	870~1700
IgM	mg/dl	35~220
C3	mg/dl	65~220
C4	mg/dl	65~135
Hp	mg/dl	19~170
HbA1c	%	4.3~5.8
Glu (空腹時)	mg/dl	75~105
【尿定性】		
尿糖		—
尿蛋白		—
ウビリノーゲン		±~+