

臨床検査基準値

東京大学医学部附属病院 臨床試験部

【血算】		
白血球数	/μl	4000～9000
赤血球数	/μl	♂410～530×10 ⁴ ♀380～480×10 ⁴
血色素量	g/dl	♂14～18 ♀12～16
ヘマトクリット値	%	♂40～48 ♀34～42
血小板数	/μl	14～40×10 ⁴
M C V	fl	78～110
M C H	pl	27～31
M C H C	%	31～36
網状赤血球数	%	0.8～2.0

【血沈】		
ESR	mm	♂0～7 ♀2～16

【白血球分画】		
Stab	%	医師の判断
Seg.	%	医師の判断
Lympho.	%	医師の判断
Mono.	%	医師の判断
Eosino.	%	医師の判断
Baso.	%	医師の判断

【凝固】		
P T (活性値)	%	70 以上
A P T T	秒	27～37
F I B	mg/dl	160～350
T T	%	70 以上
H P T	%	70～140

【生化学】		
T P	g/dl	6.3～8.1
A l b	g/dl	3.7～4.9
C h E	IU/l	♂203～460 ♀179～354
L D H	IU/l	125～237
G O T (A S T)	IU/l	9～38
G P T (A L T)	IU/l	4～36
γ—G T P	IU/l	4～68
A L P	IU/l	60～201
T B	mg/dl	0.3～1.3
D B	mg/dl	0～0.2
T C	mg/dl	129～232
H D L	mg/dl	♂30～86 ♀40～99
T G	mg/dl	29～188
C a	mg/dl	8.4～9.7
I P	mg/dl	2.5～4.5
B U N	mg/dl	9～21
C r	mg/dl	♂0.60～1.20 ♀0.40～0.90
N a	mEq/l	132～148
K	mEq/l	3.5～4.9
C l	mEq/l	96～108
U A	mg/dl	♂3.0～7.2 ♀2.1～6.0
A m y	IU/l	♂39～156 ♀57～174
C K	IU/l	♂55～210 ♀44～166

【生化学】		
F e	μg/dl	♂64～187 ♀40～162
U I B C	μg/dl	126～358
C R P	mg/dl	0.30 以下
A c P	IU/l	7.1～12.6
Pr. A c P	IU/l	2.1 以下
リパーゼ	IU/l	12～51
M g	mg/dl	1.6～2.4
胆汁酸	μmol/l	食前0～11 食後0～20
A S O	IU/ml	241 以下
R A	IU/ml	20 以下
IgA	mg/dl	110～410
IgG	mg/dl	870～1700
IgM	mg/dl	35～220
C 3	mg/dl	65～135
C 4	mg/dl	13～35
H p	mg/dl	19～170
H b A 1 c	%	4.3～5.8
G l u (空腹時)	mg/dl	75～105
【尿定性】		
尿糖		—
尿蛋白		—
ウビリノーゲン		±～+
潜血		—
pH		5.0～8.0

H16.5.31 現在 (検査部確認済) (H16.12.7 網状赤血球値 誤記の為訂正 (2.2→2.0))